

診療科： 外科

癌種： 大腸癌

レジメン名： mFOLFOX6療法

投与スケジュール： 2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m ²	点滴静注	day1
フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	day1～(46hr投与)

レジメン名： mFOLFOX6 + bevacizumab療法

投与スケジュール： 2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	day1
オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m ²	点滴静注	day1
フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	day1～(46hr投与)

レジメン名： mFOLFOX6 + panitumumab療法

投与スケジュール： 2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注	day1
オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m ²	点滴静注	day1
フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	day1～(46hr投与)

レジメン名： FOLFIRI療法

投与スケジュール： 2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
イリノテカン塩酸塩水和物	150 mg/m ²	点滴静注	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m ²	点滴静注	day1
フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	day1～(46hr投与)

レジメン名：FOLFIRI + bevacizumab療法

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	day1
イリノテカン塩酸塩水和物	150 mg/m ²	点滴静注	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m ²	点滴静注	day1
フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	day1～(46hr投与)

レジメン名：FOLFIRI + panitumumab療法

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注	day1
イリノテカン塩酸塩水和物	150 mg/m ²	点滴静注	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m ²	点滴静注	day1
フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	day1～(46hr投与)

レジメン名：FOLFIRI+RAM療法

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注	day1
イリノテカン塩酸塩水和物	150 mg/m ²	点滴静注	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m ²	点滴静注	day1
フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	day1～(46hr投与)

レジメン名：FOLFIRI + Aflibercept療法

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
アフリベルセプトベータ	4 mg/kg	点滴静注	day1
イリノテカン塩酸塩水和物	150 mg/m ²	点滴静注	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m ²	点滴静注	day1
フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	day1～(46hr投与)

レジメン名：XELOX療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	day1
カペシタビン	2000 mg/m ²	経口投与	day1～14

レジメン名：SCRT CAPOX sequential Tx療法

投与スケジュール：3週間毎

SCRT 5Gy×5days

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	day1
カペシタビン	2000 mg/m ²	経口投与	day1~14

レジメン名：XELOX+ bevacizumab療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ベバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注	day1
オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	day1
カペシタビン	2000 mg/m ²	経口投与	day1~14

レジメン名：SOX療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	day1
オテラシルカリウム ギメラシル テガフル	80 mg/m ²	経口投与	day1~14

レジメン名：SOX+ bevacizumab療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ベバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注	day1
オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	day1
オテラシルカリウム ギメラシル テガフル	80 mg/m ²	経口投与	day1~14

レジメン名：Weekly CPT-11単剤療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
イリノテカン塩酸塩水和物	100 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

レジメン名：Biweekly CPT-11単剤療法

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
イリノテカン塩酸塩水和物	150 mg/m ²	点滴静注	day1

レジメン名：CPT-11+ bevacizumab療法

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	day1
イリノテカン塩酸塩水和物	150 mg/m ²	点滴静注	day1

レジメン名：CPT-11+cetuximab療法

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
セツキシマブ	400 mg/m ²	点滴静注	day1(初回)
セツキシマブ	250 mg/m ²	点滴静注	day1(2回目以降)
イリノテカン塩酸塩水和物	150 mg/m ²	点滴静注	day1

レジメン名：CPT-11+panitumumab療法

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注	day1
イリノテカン塩酸塩水和物	150 mg/m ²	点滴静注	day1

レジメン名：Cetuximab+Encorafenib+Binimetinib療法

投与スケジュール：1週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
セツキシマブ	400 mg/m ²	点滴静注	1コース目 day1
セツキシマブ	250 mg/m ²	点滴静注	2コース目以降 day1
エンコラフェニブ	300 mg/body	経口投与	day1～7
ビニメチニブ	90 mg/body	経口投与	day1～7

レジメン名：Cetuximab+Encorafenib療法

投与スケジュール：1週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
セツキシマブ	400 mg/m ²	点滴静注	1コース目 day1
セツキシマブ	250 mg/m ²	点滴静注	2コース目以降 day1
エンコラフェニブ	300 mg/body	経口投与	day1～7

レジメン名：IRIS療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
イリノテカン塩酸塩水和物	125 mg/m ²	点滴静注	day1,15
オテラシルカリウム ギメラシル テガフル	80 mg/m ²	経口投与	day1～14

レジメン名：IRIS+bevacizumab療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	day1,15
イリノテカン塩酸塩水和物	100 mg/m ²	点滴静注	day1,15
オテラシルカリウム ギメラシル テガフル	80 mg/m ²	経口投与	day1～14

レジメン名：XELIRI療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
イリノテカン塩酸塩水和物	200 mg/m ²	点滴静注	day1
カペシタビン	1600 mg/m ²	経口投与	day1～14

レジメン名：XELIRI + bevacizumab療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ベバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注	day1
イリノテカン塩酸塩水和物	200 mg/m ²	点滴静注	day1
カペシタビン	1600 mg/m ²	経口投与	day1～14

レジメン名：RPMI(I-LV+5FU)療法

投与スケジュール：8週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
レボホリナートカルシウム水和物	250 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15,22,29,36
フルオロウラシル	500～600 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15,22,29,36

レジメン名：deGramont(I-LV+5FU) + bevacizumab療法

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m ²	点滴静注	day1
フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	day1～(46hr投与)

レジメン名：Cetuximab単剤療法

投与スケジュール：1週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
セツキシマブ	400 mg/m ²	点滴静注	day1(初回)
セツキシマブ	250 mg/m ²	点滴静注	day1(2回目以降)

レジメン名：Panitumumab単剤療法

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注	day1

レジメン名：FOLFOXIRI療法

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
イリノテカン塩酸塩水和物	150 mg/m ²	点滴静注	day1
オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m ²	点滴静注	day1
フルオロウラシル	3200 mg/m ²	持続静注	day1（～48hr投与）

レジメン名：FOLFOXIRI+Bevacizumab療法

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	day1
イリノテカン塩酸塩水和物	150 mg/m ²	点滴静注	day1
オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m ²	点滴静注	day1
フルオロウラシル	3200 mg/m ²	持続静注	day1（～48投与）

レジメン名：UFT/UZEL+Bevacizumab療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	day1,15
ウラシル テガフル	300 mg/m ²	経口投与	day1～21
ホリナートカルシウム	75 /body	経口投与	day1～21

レジメン名：TAS102+Bevacizumab療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	day1,15
チピラシル塩酸塩 トリフルリジン	70 mg/m ²	経口投与	day1～5,8～12

レジメン名：Nivolumab【240mg】単剤療法（MSI-high）

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	day1

レジメン名：Nivolumab【480mg】単剤療法（MSI-high）

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ニボルマブ	480 mg/body	点滴静注	day1

レジメン名：Nivolumab+Ipilimumab療法（MSI-high）

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	day1
イピリムマブ	1 mg/kg	点滴静注	day1

レジメン名：TAS-102単剤療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
チピラシル塩酸塩 トリフルリジン	70 mg/m ²	経口投与	day1~5,8~12

レジメン名：Regorafenib単剤療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
レゴラフェニブ水和物	160 mg/body	経口投与	day1~21

レジメン名：Capecitabine+RT療法

投与スケジュール：

RT:40~50.4Gy/20~28回

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
カペシタビン	1650 mg/m ²	経口投与	day1~5,8~12,15~19 22~26,29~33,36~38

レジメン名：TS-1+RT療法

投与スケジュール：

RT:40~50Gy/25回

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
オテラシルカリウム ギメラシル テガフル	80 mg/m ²	経口投与	day1~5,8~12,22~26 29~33