

福岡赤十字病院がん化学療法レジメン一覧

改訂日：2024年10月16日

診療科：産婦人科

癌種：子宮体癌

レジメン名：TC療法

投与スケジュール：3週間毎

| 抗癌剤（一般名） | 標準投与量 | 投与方法 | 投薬日 |
|----------|---------------------------|------|------|
| パクリタキセル | 175~180 mg/m ² | 点滴静注 | day1 |
| カルボプラチン | 5~6 =AUC | 点滴静注 | day1 |

レジメン名：Weekly TC療法

投与スケジュール：4週間毎

| 抗癌剤（一般名） | 標準投与量 | 投与方法 | 投薬日 |
|----------|-------------------------|------|-----------|
| パクリタキセル | 60~80 mg/m ² | 点滴静注 | day1,8,15 |
| カルボプラチン | 2 =AUC | 点滴静注 | day1,8,15 |

レジメン名：CBDCA+Weekly PTX療法

投与スケジュール：4週間毎

| 抗癌剤（一般名） | 標準投与量 | 投与方法 | 投薬日 |
|----------|-------------------------|------|-----------|
| パクリタキセル | 60~80 mg/m ² | 点滴静注 | day1,8,15 |
| カルボプラチン | 5~6 =AUC | 点滴静注 | day1 |

レジメン名：DC療法

投与スケジュール：3週間毎

| 抗癌剤（一般名） | 標準投与量 | 投与方法 | 投薬日 |
|-----------|-------------------------|------|------|
| ドセタキセル水和物 | 60~70 mg/m ² | 点滴静注 | day1 |
| カルボプラチン | 5~6 =AUC | 点滴静注 | day1 |

レジメン名：AP療法

投与スケジュール：3週間毎

| 抗癌剤（一般名） | 標準投与量 | 投与方法 | 投薬日 |
|-------------|-------------------------|------|------|
| ドキシソルビシン塩酸塩 | 45~60 mg/m ² | 点滴静注 | day1 |
| シスプラチン | 50 mg/m ² | 点滴静注 | day1 |

レジメン名：Weekly Paclitaxel単剤療法

投与スケジュール：4週間毎

| 抗癌剤（一般名） | 標準投与量 | 投与方法 | 投薬日 |
|----------|----------------------|------|-----------|
| パクリタキセル | 80 mg/m ² | 点滴静注 | day1,8,15 |

レジメン名：Monthly Paclitaxel単剤療法

投与スケジュール：3週間毎

| 抗癌剤（一般名） | 標準投与量 | 投与方法 | 投薬日 |
|----------|-----------------------|------|------|
| パクリタキセル | 180 mg/m ² | 点滴静注 | day1 |

レジメン名：Docetaxel単剤療法

投与スケジュール：3週間毎

| 抗癌剤（一般名） | 標準投与量 | 投与方法 | 投薬日 |
|-----------|----------------------|------|------|
| ドセタキセル水和物 | 70 mg/m ² | 点滴静注 | day1 |

レジメン名：ADM単剤療法

投与スケジュール：3週間毎

| 抗癌剤（一般名） | 標準投与量 | 投与方法 | 投薬日 |
|-------------|----------------------|------|------|
| ドキシソルピシン塩酸塩 | 60 mg/m ² | 点滴静注 | day1 |

レジメン名：Pembrolizumab【200mg/3週間毎】+Lenvatinib療法

投与スケジュール：3週間毎

| 抗癌剤（一般名） | 標準投与量 | 投与方法 | 投薬日 |
|-------------|-------------|------|------|
| ペムブロリズマブ | 200 mg/body | 点滴静注 | day1 |
| レンバチニブメシル酸塩 | 20 mg/body | 経口投与 | 連日 |

レジメン名：Pembrolizumab【400mg/6週間毎】+Lenvatinib療法

投与スケジュール：6週間毎

| 抗癌剤（一般名） | 標準投与量 | 投与方法 | 投薬日 |
|-------------|-------------|------|------|
| ペムブロリズマブ | 400 mg/body | 点滴静注 | day1 |
| レンバチニブメシル酸塩 | 20 mg/body | 経口投与 | 連日 |

レジメン名：TC(CBDCA脱感作)療法

投与スケジュール：3週間毎

| 抗癌剤（一般名） | 標準投与量 | 投与方法 | 投薬日 |
|----------|---------------------------|------|------|
| パクリタキセル | 175~180 mg/m ² | 点滴静注 | day1 |
| カルボプラチン | 総量×0.001 mg/body | 点滴静注 | day1 |
| カルボプラチン | 総量×0.01 mg/body | 点滴静注 | day1 |
| カルボプラチン | 総量×0.1 mg/body | 点滴静注 | day1 |
| カルボプラチン | 5~6 =AUC | 点滴静注 | day1 |
| | 上記を除いた分 | | |