

# 福岡赤十字病院がん化学療法レジメン一覧 改訂日：2024年10月16日

診療科： 血液・腫瘍内科

癌種： 急性前骨髄球性白血病

## レジメン名： APL2009寛解導入療法

投与スケジュール： 寛解まで投与

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
シタラビン	100 mg/m <sup>2</sup>	持続静注	day1~7
イダルビシン塩酸塩	12 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day2,4,6,8
トレチノイン	45 mg/m <sup>2</sup>	経口投与	連日 分2~3 寛解まで

## レジメン名：FBMTG APL2017寛解導入療法

投与スケジュール： 寛解まで投与

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
トレチノイン	45 mg/m <sup>2</sup>	経口投与	day1~74
三酸化二ヒ素	0.15 mg/kg	点滴静注	day15~74
イダルビシン塩酸塩	12 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	主治医の判断で投与(最大4回まで許容)
ヒドロキシカルバミド	2000~4000 mg/body	経口投与	白血球数に応じて適宜(<1万/mm <sup>3</sup> 目標)

## レジメン名：FBMTG APL2017地固め療法

投与スケジュール： 8週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
三酸化二ヒ素	0.15 mg/kg	点滴静注	day1~5,8~12,15~19,22~26
トレチノイン	45 mg/m <sup>2</sup>	経口投与	day1~14,29~42
メトトレキサート	15 mg/body	骨髄内注射	day0
シタラビン	20 mg/body	骨髄内注射	day0
デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	4 mg/body	骨髄内注射	day0

## レジメン名：JSCT APL2021寛解導入療法

投与スケジュール： 寛解まで投与

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
トレチノイン	45 mg/m <sup>2</sup>	経口投与	day1~74
三酸化二ヒ素	0.15 mg/kg	点滴静注	PML-RARA陽性~74
イダルビシン塩酸塩	12 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	主治医の判断で投与(最大4回まで許容)
ヒドロキシカルバミド	2000~4000 mg/body	経口投与	白血球数に応じて適宜(<1万/mm <sup>3</sup> 目標)

## レジメン名：髄注化学療法（APL2009地固め-2）

投与スケジュール：

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
メトトレキサート	15 mg/body	骨髄内注射	day0
シタラビン	20 mg/body	骨髄内注射	day0

## レジメン名：Tamibarotene単剤療法

投与スケジュール：連日投与

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
タミバロテン	6 mg/m <sup>2</sup>	経口投与	day1～55

## レジメン名：ATRA単剤療法

投与スケジュール：連日投与

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
トレチノイン	45 mg/m <sup>2</sup>	経口投与	連日